

## O QUE É?

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres (excetuando-se o câncer de pele não melanoma). É causado pela infecção persistente por alguns tipos de HPV (papilomavírus humano), que são muito comuns na população e, na maioria das vezes, não causam a doença. No entanto, algumas vezes o vírus causa alterações que podem evoluir para o câncer. Essas alterações **podem ser facilmente identificadas no exame preventivo (Papanicolau), permitindo o tratamento e cura em quase todos os casos.**



**PARANÁ**  
ROSA

[www.paranarosa.pr.gov.br](http://www.paranarosa.pr.gov.br)



O QUE VOCÊ PRECISA  
SABER SOBRE O  
CÂNCER DO  
COLO DO ÚTERO



## O QUE AUMENTA O RISCO DE TER CÂNCER DO COLO DO ÚTERO?

- Tabagismo;
- Início precoce da atividade sexual;
- Múltiplos parceiros sexuais;
- Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais.



## COMO REDUZIR O RISCO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO?

Uma importante estratégia para a prevenção do câncer do colo do útero é a **vacinação contra o HPV**, que é ofertada para meninas com idade entre 9 a 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Assim, é possível a prevenção contra a infecção pelo HPV, reduzindo o risco de desenvolver este tipo de câncer. **A vacina está disponível gratuitamente no SUS**, nas unidades de saúde.

Mulheres imunossuprimidas, transplantadas, portadoras de câncer ou que vivem com HIV/AIDS podem receber a vacina até os 45 anos de idade.

Como a transmissão do HPV ocorre por via sexual, **o uso de preservativo (camisinha masculina ou feminina) durante a relação sexual também auxilia na prevenção do contágio do HPV.**

Mesmo mulheres vacinadas devem fazer o exame preventivo conforme preconizado.

## QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS?

Como é uma doença de desenvolvimento lento, pode não apresentar sintomas na fase inicial. Em casos mais avançados, pode haver os seguintes sinais e sintomas:

- Sangramento vaginal intermitente;
- Sangramento após a relação sexual;
- Secreção vaginal anormal;
- Dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.



## COMO FAZER A DETECÇÃO PRECOCE?

A detecção precoce do câncer do colo do útero é feita por meio da identificação de lesões pré cancerígenas (lesões causadas pelo HPV, que podem evoluir para um tumor maligno). **A detecção dessas lesões na fase inicial permite chances de cura de até 100%.**

**Essas lesões podem ser identificadas pelo exame preventivo (Papanicolau)**, que é um exame simples e rápido. Por isso é tão importante realizar este exame, dentro da periodicidade recomendada.



## O EXAME PREVENTIVO ESTÁ EM DIA?

**Mulheres (ou qualquer pessoa com colo do útero, incluindo homens transexuais e pessoas não binárias designadas mulher ao nascer) de 25 a 64 anos, que já iniciaram a atividade sexual devem realizar o exame preventivo.** É importante salientar: os dois primeiros exames devem ser feitos anualmente e, se os resultados estiverem normais, só é necessário fazer o exame a cada três anos.

**Onde fazer o exame preventivo?**  
**O exame pode ser feito em qualquer unidade de saúde.**

Preparo para o exame preventivo:

- Não ter relações sexuais (mesmo com camisinha) no dia anterior ao exame
- Evitar o uso de duchas e medicamentos vaginais 48 horas antes do exame
- Não estar menstruada

**Lembre-se: buscar o resultado é tão importante quanto fazer o exame!** É preciso retornar ao local onde o exame foi feito para saber o resultado, e seguir todas as orientações do profissional de saúde.

